

## FICHA TÉCNICA

### 1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO

2LHERP glóbulos

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

3 blíster de 10 cápsulas duras. Cada cápsula contiene:

Cápsula 1:	
Ácido desoxirribonucleico: 10 CH	0,0038ml
Ácido ribonucleico: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HER1: 18 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HER2: 18 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA I: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH	0,0038ml

Cápsula 2:	
Ácido desoxirribonucleico: 8 CH	0,0038ml
Ácido ribonucleico: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HER1: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HER2: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA I: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH	0,0038ml

Cápsula 3:	
Ácido desoxirribonucleico: 10 CH	0,0038ml
Ácido ribonucleico: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HER1: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HER2: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA I: 18 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 18 CH	0,0038ml

Cápsula 4:	
Ácido desoxirribonucleico: 10 CH	0,0038ml
Ácido ribonucleico: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HER1: 18 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HER2: 18 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA I: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH	0,0038ml

Cápsula 5:	
Ácido desoxirribonucleico: 10 CH	0,0038ml
Ácido ribonucleico: 8 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HER1: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HER2: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA I: 10 CH	0,0038ml
Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH	0,0038ml

<i>Cápsula 6:</i>	
<i>Ácido desoxirribonucleico: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido ribonucleico: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HER1: 18 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HER2: 18 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA I: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>

<i>Cápsula 7:</i>	
<i>Ácido desoxirribonucleico: 8 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido ribonucleico: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HER1: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HER2: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA I: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>

<i>Cápsula 8:</i>	
<i>Ácido desoxirribonucleico: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido ribonucleico: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HER1: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HER2: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA I: 18 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 18 CH</i>	<i>0,0038ml</i>

<i>Cápsula 9:</i>	
<i>Ácido desoxirribonucleico: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido ribonucleico: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HER1: 18 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HER2: 18 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA I: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>

<i>Cápsula 10:</i>	
<i>Ácido desoxirribonucleico: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido ribonucleico: 8 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HER1: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HER2: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA I: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>
<i>Ácido Nucleico Específico SNA HLA II: 10 CH</i>	<i>0,0038ml</i>

Excipientes con efecto conocido: lactosa (0,066 gr.) sacarosa (0,313 gr.)

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Glóbulos esféricos o casi esféricos, de color blanco o casi blanco y con un tamaño 1 (1000-1600 micrómetros), acondicionados en cápsulas duras desechables, que son administrados por vía sublingual.

### 4. DATOS CLÍNICOS

#### 4.1 Indicaciones terapéuticas

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas (Directiva 2001/83/CE).

#### 4.2 Posología y forma de administración

##### Posología

La posología recomendada es de una cápsula al día por vía sublingual, respetando el orden numérico de las cápsulas. Ocasionalmente y por indicación médica, se incrementará el ritmo del tratamiento.

##### *Población pediátrica*

No se dispone de datos.


##### Forma de administración

2LHERP glóbulos se administra por vía sublingual abriendo la cápsula y vertiendo su contenido debajo de la lengua. Los glóbulos se mantienen debajo de la lengua hasta que se disuelven.


Se recomienda tomar el medicamento preferiblemente por la mañana en ayunas, 15 o 30 minutos antes del desayuno o, en caso de olvido, una hora después del mismo.

#### **NO tragar las cápsulas enteras.**


1. Empiece con uno de los tres blísters del interior de la caja.



2. Tome la cápsula siguiendo la numeración.



3. Abra la cápsula cuidadosamente con la cabeza de la cápsula hacia arriba.



4. Vierta su contenido debajo de la lengua y deje que se disuelva.



Siga el orden numérico de las cápsulas indicado en el blíster. Al finalizar el primer blíster, continúe con la cápsula 1 del siguiente blíster y así hasta finalizar el tratamiento.

#### **4.3 Contraindicaciones**

Este medicamento está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a los principios activos o a los excipientes incluidos en la sección 6.1.

#### **4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo**

Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento.

Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción a la glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este medicamento.

Nota general: Se recomienda evitar la ingesta de alimentos estimulantes (menta, té, café, chocolate, etc.) en la hora que precede a la toma del medicamento.

#### **4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

No se han realizado estudios de interacciones.

Se debe advertir a los pacientes que informen a su médico o farmacéutico si están tomando o han tomado recientemente algún otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

#### **4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia**

No hay datos o estos son limitados relativos al uso de 2LHERP glóbulos en mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

Se aconseja consultar al médico, antes de utilizar este medicamento en embarazo y lactancia.

#### **4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

No se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

#### **4.8 Reacciones adversas**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Para los medicamentos homeopáticos los posibles efectos adversos derivan de las propiedades farmacológicas o toxicológicas de las materias primas o excipiente(s). No se dispone de estudios clínicos que informen sobre la frecuencia de las reacciones adversas.

Tradicionalmente, el uso de medicamentos homeopáticos puede dar lugar temporalmente a una sensación de agravación de los síntomas, que suelen desaparecer después de unos días. Si los síntomas persisten, consulte con su médico, profesional sanitario o farmacéutico.

#### Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar cualquier sospecha de reacción adversa al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano (<http://www.notificaram.es>).

#### **4.9 Sobredosis**

No se han notificado casos de sobredosis.

### **5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

#### **5.1 Propiedades farmacodinámicas**

Grupo farmacoterapéutico: V03AX-Otros productos farmacéuticos. Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas (Directiva 2001/83/CE).

#### **5.2 Propiedades farmacocinéticas**

No aplicable para estos medicamentos homeopáticos.

#### **5.3 Datos preclínicos sobre seguridad**

No hay datos adicionales preclínicos importantes.

### **6. DATOS FARMACÉUTICOS**

#### **6.1 Lista de excipientes**

Lactosa y sacarosa.

#### **6.2 Incompatibilidades**

No se han descrito

### **6.3 Periodo de validez**

3 años.

### **6.4 Precauciones especiales de conservación**

No requiere condiciones especiales de conservación.

### **6.5 Naturaleza y contenido del envase**

Acondicionamiento primario: cápsulas duras.

Acondicionamiento secundario: estuche con 3 blísters de PVC/AL que contienen 10 cápsulas cada uno.

### **6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones**

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

## **7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Labo'Life España S.A.U.

Av. des Raiguer, 7

07330 Consell, España

## **8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

## **9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN**

02/2023

## **10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO**

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) (<http://www.aemps.gob.es/>).